

**uso veterinario**  
*solución inyectable*



# FLORAN TRIVALENTE

Número de Registro:  
Q-7692-047



Contenido neto: 100 y 250 mL

**florfenicol,  
paracetamol,  
bromhexina**

## FÓRMULA

Cada mL contiene:

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Florfenicol.....  | 400 mg |
| Paracetamol.....  | 100 mg |
| Bromhexina.....   | 5 mg   |
| Vehículo cbp..... | 1 mL   |

Para más información ingresa en  
[www.florantriv.alphachem.mx](http://www.florantriv.alphachem.mx)



alphachem



alphachemoficial



alphachem



alphachem

 **ALPHA CHEM**<sup>®</sup>

### INDICACIONES:

El florfenicol en bovinos es efectivo en el tratamiento de: enfermedad respiratoria bovina (ERB), asociado con *Mycoplasma spp*, *Pasteurella multocida* e *Histophilus somni*. Está indicado en el tratamiento de pododermatitis infecciosa asociada con *Fusobacterium necrophorum* y *Prevotella melanogenica*; así como de queratoconjuntivitis infecciosa bovina causada por *Moraxella bovis*.

En porcinos, se utiliza para el tratamiento de: enfermedad respiratoria porcina (ERP), causada por *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella choleraesuis* y *Streptococcus suis*, los cuales son también partícipes en padecimientos de diarreas y mastitis, que disminuyen los índices de lactación en las cerdas.

El paracetamol, se utiliza para el control de la fiebre y dolor, por su efecto antipirético y analgésico. La bromhexina se emplea en enfermedades respiratorias que cursen con un incremento en la producción de moco y/o viscosidad. En combinación con antibióticos incrementa su penetración en los tejidos de las vías respiratorias.

**FLORAN TRIVALENTE** está indicado en el tratamiento de infecciones bacterianas asociadas a procesos inflamatorios, febriles y daño tisular severo.

**Bovinos:** enfermedades respiratorias (*Pasteurella spp*, *Histophilus somni* y *Mycoplasma spp*), mastitis, septicemias, queratoconjuntivitis infecciosa bovina, pododermatitis y diarrea.

**Porcinos:** complejo respiratorio porcino, síndrome mastitis-metritis-agalactia, diarrea y enfermedades causadas por *Rickettsias* y *Chlamydia*.

### ESPECIES DE DESTINO:

**Bovinos:** productores de carne y leche.

**Porcinos:** crecimiento, desarrollo y reproductores.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

**Bovinos:** intramuscular (IM) y subcutánea (SC).

**Porcinos:** intramuscular (IM).

### DOSIS:

**Bovinos:** aplique vía IM, 1 mL de **FLORAN TRIVALENTE** por cada 15 Kg de peso corporal (PC), cada 48 horas, equivalente a 20 mg de florfenicol, 6.6 mg de paracetamol y 0.5 mg de bromhexina por Kg de PC.

Aplique 2 mL de **FLORAN TRIVALENTE** por cada 15 Kg de PC, dosis única SC, equivalente a 40 mg de florfenicol, 13.33 mg de paracetamol y 1.0 mg de bromhexina por Kg de PC.

**Porcinos:** aplique vía IM, 1 mL de **FLORAN TRIVALENTE** por cada 30 Kg de PC, cada 48 horas, equivalente a 10 mg de florfenicol, 3.3 mg de paracetamol y 0.5 mg de bromhexina por Kg de PC.

La dosis y días de tratamiento, depende de la severidad de la enfermedad y del criterio del médico veterinario.

### ADVERTENCIAS:

- Tiempo de retiro para carne, bovinos: IM 28 días, SC 38 días, 7 días leche. Porcinos: 16 días.
- No destinar al consumo humano la leche de los animales tratados con **FLORAN TRIVALENTE**.
- No se administre en animales alérgicos a los componentes de la fórmula.
- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.
- Almacenar a no más de 30 °C, en un lugar seco, fresco y protegido de la luz.
- Exclusivamente para uso veterinario.
- Disponga de forma correcta de los residuos y recipientes del producto, acorde a la normatividad de cada región.



[www.alphachem.mx](http://www.alphachem.mx)  
[www.florantriv.alphachem.mx](http://www.florantriv.alphachem.mx)

# FLORAN TRIVALENTE

*solución inyectable*

Contenido neto:  
100 y 250 mL

**florfenicol, paracetamol, bromhexina**

**uso veterinario**