



Ivermectina **LA** Calox



**el PODER de una
sola DOSIS**

Exclusivo "Modificador de Absorción" MABS

Ivermectina LA



Ivermectina LA Calox, antiparasitario eficaz contra parásitos internos y externos; su fórmula especialmente diseñada posee un modificador de absorción que permite que la concentración de Ivermectina en sangre se eleve y se mantenga 56 días.

Composición:

Ivermectina 1 g
Vehículos c.s.p. 100 mL

Mecanismo de Acción	Características / Ventajas
El GABA es un neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. En nemátodos y artrópodos el GABA media la relajación muscular, transmitiendo impulsos inhibitorios, basados en un receptor de alta afinidad, resultando en un incremento en la permeabilidad de iones cloro con la consiguiente hiperpolarización de la membrana y desprendimiento del parásito por parálisis flácida.	<ul style="list-style-type: none"> • Endectocida de amplio espectro (ecto y endoparásitos) • Acción residual de protección total hasta por 56 días • Sin efectos secundarios • Nula a ninguna toxicidad • Compatible con otros medicamentos • Ningún efecto sobre la fertilidad

Indicaciones: **Ivermectina LA Calox** endectocida inyectable, está formulada con un Modificador de Absorción especial que le brinda un efecto prolongado y conservando la alta efectividad de la molécula para el tratamiento y control de las parasitosis internas y externas más importantes de los rumiantes y cerdos. Proporcionando una desparasitación total sobre larvas y adultas de parásitos nemátodos gastrointestinales y pulmonares, eliminando los parásitos externos causantes de miasis cutáneas (tórsalos); piojos y moscas chupadoras (tábanos); ácaros de la sarna y garrapatas y permitiendo que la concentración de Ivermectina en sangre y tejidos se eleve y mantenga por más tiempo.

Dosificación:

Bovinos, caprinos, ovinos 1 mL por cada 50 Kg.
Porcinos 1 mL por cada 33 Kg.
Repetir la administración cada 2-3 meses.

Período de protección total

Especie	Persistencia
Ostertagia sp	38 días
Haemonchus	38 días
Trichostrongylus	35 días
Cooperia	35 días
Dictyocaulus	35 días
Sarna sarcóptica	35 días
Sarna psoróptica	35 días
Tórsaldo	56 días
Garrapata	35 días

Vía de Administración:

Únicamente por vía subcutánea (adelante o atrás de la paleta).

Presentación:

Frascos de 50 mL, 60 mL, 100 mL, 200 mL, 240 mL, 500 mL, 600 mL.

Cantidad de animales por presentación

Peso	Presentación						
	50 mL	60 mL	100 mL	200 mL	240 mL	500 mL	600 mL
200 Kg	12	15	25	50	60	125	150
400 Kg	6	7	12	25	30	62	75



Atrás