

SUPERMETRINA POUR ON



FÓRMULA:

Cipermetrina	5%
Etión	15%
Solventes, repelentes, emulsificantes adherentes e ingrediente inertes	No más de 80%
Total	100%

Supermetrina pour on es un ectoparasitocida formulado a base de cipermetrina (piretroide) y etión (organofosforado). Con efecto sinérgico sobre moscas y otros ectoparásitos.

La **cipermetrina** se caracteriza por tener una acción insecticida y acaricida inmediata al contacto con los parásitos externos, mismos que sufren un bloqueo de la transmisión de los impulsos nerviosos, lo que origina su muerte.

El **etión**, por su parte, es un organofosforado, que al inhibir la actividad de la enzima acetilcolinesterasa, altera el proceso fisiológico de la transmisión del impulso nervioso en los parásitos, lo que provoca parálisis y muerte.

INDICACIONES: **Supermetrina pour on** se indica para el control de ectoparásitos, como la mosca del cuerno (*Haematobia irritans*) mosca del establo (*Stomoxys calcitrans*), piojos chupadores y masticadores, (*Damalinea bovis*, *Haematopinus eurysternus*, *Linognathus vituli*), la falsa garrapata del ganado ovino (*Melophagus ovinus*) y ácaros causantes de la sarna (*Sarcoptes scabiei*, *Chorioptes bovis*, *Demodex sp*).

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN: Aplique sobre el dorso del animal, desde la cruz y hasta la cola, utilizando el vaso dosificador del envase.

DOSIS:

Animales de 100 a 200 kg de peso corporal: 5 ml

Animales de 200 kg ó más: 10 ml

RECOMENDACIONES:

Trate a todo el hato en un solo tiempo.

No se aplique sobre animales mojados

Uso exclusivamente externo.

PERIODO DE RETIRO: La carne de los animales tratados con este producto no deberán de ser consumidas sino hasta después de un tiempo de retiro de 10 días. No tiene periodo de retiro en leche

ADVERTENCIAS: Evite beber, comer, o fumar mientras se maneja el producto. Evite su ingestión, así como el contacto con mucosas ojos, en cuyo caso, se recomienda lavar con agua en abundancia.

Use equipo de protección (guantes y ropa protectora) al momento de la aplicación.

TRATAMIENTO: Este producto está formulado con Cipermetrina, un piretroide y con Etión, un Organofosforado. Pueden presentarse algunas reacciones en contacto con el producto, si se ingiere puede causar náuseas, vértigo, vomito, dolor abdominal, sudoración y salivación excesivas, visión borrosa, miosis, tremor y espasmos musculares, dificultad para respirar, incoordinación y, en caso graves, la pérdida del conocimiento. Las manifestaciones nerviosas pueden variar de moderadas a graves.

En caso de ingestión se puede provocar el vómito, si la persona esta consciente. Consulte al médico y muéstrela la etiqueta.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Consérvese en su envase original, en un lugar fresco y al abrigo de la luz. Guárdese bajo llave. No se deje al alcance de los niños ni de las mascotas. No se transporte ni se almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

NO SE DESECHE EN RÍOS, LAGOS O EL MAR, YA QUE ES MUY TÓXICO PARA LA MAYORÍA DE LOS PECES. DESTRUYA LOS ENVASES DESPUÉS DE UTILIZARLOS.

Distribuidor Autorizado en Panamá



Frente a Plaza Carolina, Edif. Los Alamos, Local No. 14

Tel.: 233-3861 • Telefax: 233-0944

E-mail: info@insuvetsa.com • www.insuvetsa.com



Confianza que genera Resultados
Uruguay

SUPERMETRINA BAÑO



FÓRMULA:

Cipermetrina	10%
Etión	40%
Solventes, repelentes, emulsificantes adherentes e ingrediente inertes	No más de 50%
Total	100%

Supermetrina Baño es un ectoparasiticida formulado a base de cipermetrina (piretroide) y etión (organofosforado). Con efecto sinérgico sobre moscas y otros ectoparásitos.

La **cipermetrina** se caracteriza por tener una acción insecticida y acaricida inmediata al contacto con los parásitos externos, mismos que sufren un bloqueo de la transmisión de los impulsos nerviosos, lo que origina su muerte.

El **etión**, por su parte, es un organofosforado, que al inhibir la actividad de la enzima acetilcolinesterasa, altera el proceso fisiológico de la transmisión del impulso nervioso en los parásitos, lo que provoca parálisis y muerte.

INDICACIONES: **Supermetrina Baño** se indica para el control de ectoparásitos, como la mosca del cuerno (*Haematobia irritans*) mosca del establo (*Stomoxys calcitrans*), piojos chupadores y masticadores, (*Damalinea bovis*, *Haematopinus eurysternus*, *Linognathus vituli*), la falsa garrapata del ganado ovino (*Melophagus ovinus*) y ácaros causantes de la sarna (*Sarcoptes scabiei*, *Chorioptes bovis*, *Demodex sp*), garrapatas sarna y piojos.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN: Aplique sobre todo el animal, a una dosis de 5 lt por cada 500 kg de PV.

DOSIS:

1 ml de **Supermetrina Baño** por Lt de agua

RECOMENDACIONES:

Trate a todo el hato en un solo tiempo.
No se aplique sobre animales mojados
Uso exclusivamente externo.

FRECUENCIA DE USO:

Dependerá de la infestación.

PERIODO DE RETIRO: La carne de los animales tratados con este producto no deberán de ser consumidas sino hasta después de un tiempo de retiro de 14 días y tiene periodo de retiro en leche de 2 días.

ADVERTENCIAS: Evite beber, comer, o fumar mientras se maneja el producto. Evite su ingestión, así como el contacto con mucosas ojos, en cuyo caso, se recomienda lavar con agua en abundancia. Use equipo de protección (guantes y ropa protectora) al momento de la aplicación.

TRATAMIENTO: Este producto está formulado con Cipermetrina, un piretroide y con Etión, un Organofosforado. Pueden presentarse algunas reacciones en contacto con el producto, si se ingiere puede causar náuseas, vértigo, vomito, dolor abdominal, sudoración y salivación excesivas, visión borrosa, miosis, tremor y espasmos musculares, dificultad para respirar, incoordinación y, en caso graves, la pérdida del conocimiento. Las manifestaciones nerviosas pueden variar de moderadas a graves.

En caso de ingestión se puede provocar el vómito, si la persona esta consciente. Consulte al médico y muéstrela la etiqueta.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Consérvese en su envase original, en un lugar fresco y al abrigo de la luz. Guárdese bajo llave. No se deje al alcance de los niños ni de las mascotas. No se transporte ni se almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

NO SE DESECHE EN RÍOS, LAGOS O EL MAR, YA QUE ES MUY TÓXICO PARA LA MAYORÍA DE LOS PECES. DESTRUYA LOS ENVASES DESPUÉS DE UTILIZARLOS.

Distribuidor Autorizado en Panamá



Frente a Plaza Carolina, Edif. Los Alamos, Local No. 14
Tel.: 233-3861 • Telefax: 233-0944
E-mail: info@insuvetsa.com • www.insuvetsa.com



Confianza que genera Resultados
Uruguay