

INSTRUCCIONES ROMELKO® STIMULATE 2 HARINA



ADMINISTRAR EN FORMA LÍQUIDA ANTES DEL DESTETE

PROPORCIÓN DE MEZCLA RECOMENDADA: MEZCLAR 1 PORCIÓN DE ROMELKO® ORANGE CON 2 PORCIONES DE AGUA!

PLAN DE ALIMENTACIÓN CON ROMELKO® ORANGE ANTES DEL DESTETE (POR LECHÓN)				
Día	Stimulate 2 Harina (g)	Agua (ml)	Total (g)	% de materia seca de la mezcla
5	5	10	15	30%
6	5	10	15	30%
7	5	10	15	30%
8	5	10	15	30%
9	5	10	15	30%
10	10	20	30	30%
11	10	20	30	30%
12	15	30	45	30%
13	15	30	45	30%
14	15	30	45	30%
15	20	40	60	30%
16	20	40	60	30%
17	20	40	60	30%
18	25	50	75	30%
19	25	50	75	30%
20	25	50	75	30%
21	25	50	75	30%
Total	250	Destete a 21 días		

22	30	60	90	30%
23	30	60	90	30%
24	30	60	90	30%
25	30	60	90	30%
26	40	80	120	30%
27	40	80	120	30%
28	50	100	150	30%
Total	500	Destete a 28 días		

CONSEJOS PARA USUARIOS:

- ▶ Preparar la mezcla con agua templada (25° C) para obtener el mejor resultado.
- ▶ Preparar diariamente la mezcla fresca; limpiar la mezcladora o el cubo después del uso.
- ▶ Administrar la mezcla 2-3 veces al día y el comedero debe quedar vacío en 30 minutos.
- ▶ Administrar diariamente pienso fresco de destete a partir de las 2 o 3 semanas siguientes al nacimiento.
- ▶ Empezar a disminuir antes las cantidades en el supuesto de destete más temprano.
- ▶ El esquema anterior es una indicación; para más posibilidades de uso consulte con su especialista.



ADMINISTRAR EN FORMA LÍQUIDA DESPUÉS DEL DESTETE

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN CON ROMELKO® STIMULATE 2 HARINA DESPUÉS DEL DESTETE (POR LECHÓN Y POR DÍA) JUNTO CON ALIMENTO NORMALES DE DESTETE				
Día	Stimulate 2 Harina (g)	Agua (ml)	Total (g)	% de materia seca de la mezcla
0	100	200	300	30%
1	150	300	450	30%
2	250	500	750	30%
Total	500			

PROPORCIÓN DE MEZCLA RECOMENDADA: MEZCLAR 1 PORCIÓN DE ROMELKO® ORANGE CON 2 PORCIONES DE AGUA!

CONSEJOS PARA USUARIOS:

- ▶ Día 0 (= día de destete): administrar la mezcla en una sola vez después del destete.
- ▶ Día 1 y 2 después del destete: administrar la mezcla en 3-4 veces al día.
- ▶ Preparar la mezcla con agua templada (25° C) para obtener el mejor resultado.
- ▶ Como mínimo un espacio de comedero por lechón.
- ▶ El comedero debe quedar vacío en 30 minutos.
- ▶ Los primeros 3 días después del destete, mezclar Romelko® Stimulate 2 Harina también en seco con pienso de destete.
- ▶ El tercer día después del destete, dejar de suministrar Romelko® Stimulate 2 Harina en comedero redondo auxiliar.
- ▶ Preparar diariamente la mezcla fresca; limpiar la mezcladora o el cubo después del uso.
- ▶ El esquema anterior es una indicación; para más posibilidades de uso consulte con su especialista.